

POLÍTICA DE PRIMEROS AUXILIOS

Es responsabilidad del instructor asegurar que los estudiantes comprendan y respeten la siguiente política de primeros auxilios. En caso de accidente, enfermedad o cortada, el estudiante debe informar al instructor inmediatamente. El instructor le ayudará a determinar la extensión de la lesión y si es algo que puede tratarse en la escuela con el kit de primeros auxilios, o si es algo que necesita atención médica.

En el caso de una cortada pequeña, seguir el Procedimiento adecuado de Derrame de Sangre indicado en la política ED-121.

En caso de lesión química, o exposición a los ojos, lavar los ojos con la solución salina contenida en el kit de primeros auxilios y referir inmediatamente a un médico.

En caso de una quemadura, colocar la zona quemada bajo agua fría durante cinco minutos (o aplicar una compresa fría en la zona). Cubrir el área quemada con gasa estéril. Si la quemadura es grave, referir a un médico.

Puede encontrar un botiquín de primeros auxilios en el/(los) siguiente(s) lugar(es).

Como mínimo, el botiquín de primeros auxilios contiene los siguientes elementos.

- Curitas (varios tamaños)
- Gasa estéril
- Cinta adhesiva
- Solución antiséptica
- Aspirina
- Líquido para lavar los ojos / Solución salina
- Crema antibiótica

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DE SANGRE – POLÍTICA DEL ESTUDIANTE

PROCEDIMIENTO:

El estudiante debe seguir el siguiente procedimiento si se produce un derrame de sangre (ya sea cliente o alumno).

1. Detener inmediatamente el servicio y ponerse los guantes. Informar al instructor y al cliente de lo que ha ocurrido.
2. Aplicar una presión ligera en el sitio de sangrado con algodón y un antiséptico.
3. Aplicar alumbre en polvo u otro astringente (líquido o en aerosol). No contaminar el recipiente. No utilizar una barrita astringente.
4. Aplicar un vendaje en la cortada, si es necesario.
5. Desechar todos los instrumentos desechables y materiales contaminados con sangre en una bolsa doble. Usar un marcador rojo identificando la bolsa como un peligro biológico. Desechar la bolsa.
6. Para dispositivos desechables afilados, depositar en una caja de agujas si está disponible. Si no hay una caja de agujas disponible, envolver el objeto afilado con cinta de embalaje y seguir las indicaciones descritas en el paso #5.
7. Una vez que se quite los guantes, lavarse las manos con jabón y agua tibia.
8. Terminar el servicio.
9. Desinfectar completa y correctamente todos los utensilios que hayan estado en contacto con sangre o fluidos corporales en una solución tuberculocida desinfectante, registrada por el EPA y de uso en hospitales.